

Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler

Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. **Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda** terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca **şişmanlık**, herhangi bir hastalığa bağlı **yüksek ateş**, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon), **kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu** madde kullanımı ile tedavi amaçlı **bazı ilaçların** (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir.



Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar:

- Yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar,
- Dört yaşından küçük çocuklar,
- Bakıma ihtiyacı olanlar,
- Hamileler,
- Açık alanda çalışanlar,
- Aşırı kilolular,
- Kronik hastalığı (şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları) olanlar
- Sürekli ilaç (özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullanan kişiler,
- Sokak çocukları ve evsizlerdir.

Özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlılar en çok risk taşıyan gruptur.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ ?

A. Genel Korunma



- G n n en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadık a dıřarı  ıkılmamalıdır.
- Dıřarıda  alıřması gerekenler m mk n olduk a g neř altında korunmasız kalmamaya, ařırı hareketlerden ka ınmaya, sık sık tuz i eren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler. • Dıřarıda bulunulduėunda **a ık renkli, hafif, bol** ve sıkı dokunmuř kumařlardan yapılan giysiler tercih edilmeli; geniř kenarlı ve hava delikleri olan **řapka** giyilmeli ve g neřin zararlı ışınlarından koruyan **g neř g zl ė ** kullanılmalıdır.
- G neř ışınlarının dik geldiėi saatlerde (10.00-16.00) **denize girilmemeli ve g neřlenilmemelidir**. Bu saatlerin dıřında denize girmek isteyenler **g neřten koruyucu krem**(en az 15 koruma fakt rl ) kullanmalı, řapka ve g zl k gibi gerekli koruyucu  nlemleri almalı ve uzun s re kesintisiz g neřlenmemelidir.
- Yoėun fiziksel aktivite ve spor yapmak i in sabah ve akřam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor i in **en az 2-4 bardak sıvı** alınmalıdır. Aėır fizik aktivitelere ka ınılmalıdır.
- Risk altındaki yetiřkinler ve yařlılar, g nde en az iki kez g neř veya sıcak  arpması y n nden izlenmelidir. Bebekler ise bu a ıdan daha sık izlenmelidir.
- Bebek,  ocuk, engelliler ve hayvanlar **kapalı ve park etmiř ara larda** kesinlikle bırakılmamalıdır. Ara ların i  ısıları, klima olsa dahi park edildikten  ok kısa s re sonra y kselmektedir. Ara  terk edilirken herkesin dıřarı  ıktıėından emin olunmalıdır.

- Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır.
- Güneş gören pencereler perde vb. güneşliklerle gölgelendirilmelidir.
- Vücut ısının yükselmemesi için **sık sık duş** alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir.

B. Beslenme ve Sıvı Alımı



- Susuzluk hissi olmasa bile her gün **en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) sıvı** tüketilmelidir.
- Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir.
- **Yağlı besinlerin** ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalıdır. Yemekleri pişirirken **kızartma ve kavurma yerine** haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır.
- Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için **bol miktarda sebze ve meyve** tüketilmelidir.
- Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden **daha fazla miktarlarda sıvı** alınmalıdır.

- Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Eğer doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya idrar söktürücü ilaç kullanılması söz konusu ise ilgili doktora başvurmak gerekir.

- Mide kramplarına neden olabileceği için **çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir.**

- Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı için tüketilmemelidir.

- **Dışarıda ve açıkta satılan** yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir.